

世卫组织基本药物 标准清单

第15版（2007年3月）

文件现状

这是从世卫组织药物网站

<http://www.who.int/medicines/publications/EML15.pdf>

翻印的文本

基本药物

世界卫生组织标准清单（2007年3月修订）

解释性说明

核心清单是指为基本卫生保健系统所必需的最起码的药物清单，清单中列入对治疗重点疾病最有效、安全和符合成本疗效的药物。重点疾病的选择系根据目前和将来的公共卫生相关问题及药物的潜在安全性和治疗成本疗效确定。

补充清单列出治疗重点疾病的基本药物，这些重点疾病需要专科诊断或监测设施，和/或专家医疗保健，和/或专家培训。在有疑问时，很多情况下也可将价格一直较高或成本疗效不太好的药物列入补充清单。

方框符号（□）主要目的是指出在一类药物中的相似临床作用。清单中的药物应是有最佳证据显示有效性和安全性的该类药物中的范例。在一些情况下，这种药物可能是最初获得销售许可证的药物；在另外一些情况下，后来获得许可证的药物可能更加安全或更加有效。在有效性和安全性数据方面没有差别的情况下，列入清单的药物应是根据国际药物价格信息来源以最低价格能够广泛获得的药物。

只有在对有效性和安全性审查的基础上并符合世界卫生组织临床准则的情况下才能指出药物的同等治疗效果。国家药物清单不应使用相似的符号并应在最后的遴选中具有特别性，它们取决于地方的可得性和价格。各节中的药物按英文字母顺序排列。

基本药物清单列入某一条目，并不意味着保证其药物质量。每一地方管制当局有责任确保每种品牌达到适当的药物质量（包括稳定性），并在适当时，不同的品牌可互换。

药物剂型按英文字母顺序排列，并不意味着一种剂型比另一种更好。关于适当剂型的信息，应当参考标准治疗准则。

口服液类型的条目旨在允许使用任何溶液、混悬液或其它形式的液体。用于复原成口服液的颗粒可替代口服液，通常的好处是更稳定，而且运输费用较低。如果同一市场上可获得一种以上的口服液（例如溶液、混悬液、还原颗粒），它们可互换并在这种情况下应当具有生物相等性。口服液最好不含糖，供儿童使用的溶液最好不含酒精。

片剂类型的条目旨在允许使用各种形式的速溶片剂，例如无包衣片、薄膜衣片、可压碎的片剂、咀嚼片、分散片等。另一方面，肠溶片包衣可改变药物释放，所以肠溶片是一种缓释剂型。可压碎的药片、咀嚼片和分散片便于儿科患者和老年人服用。

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

1. 麻醉药	
1.1 全身麻醉药和氧气	
氟烷	吸入
氯胺酮	注射剂：50 mg（作为盐酸盐）/ml，用10-ml安瓿
氧化亚氮	吸入
氧气	吸入（药用气体）
□ 硫喷妥钠	注射用粉剂：0.5 g，1.0 g（钠盐）安瓿
1.2 局部麻醉药	
□ 布比卡因	注射剂：0.25%，0.5%（盐酸盐）小瓶 脊髓麻醉用注射剂：0.5%（盐酸盐）4-ml安瓿，与7.5% 的葡萄糖溶液混合
□ 利多卡因	注射剂：1%，2%（盐酸盐）小瓶； 脊髓麻醉注射剂：5%（盐酸盐）2-ml安瓿与7.5%葡萄糖溶液混合， 局部使用：2-4%（盐酸盐）
利多卡因 + 肾上腺素 （副肾素）	牙科注射：用2%（盐酸盐）+ 肾上腺素1:80 000 注射剂：1%，2%（盐酸盐）+ 肾上腺素1:200 000小瓶
补充清单	
麻黄素	注射剂：30 mg（盐酸盐）/ml 1-ml 安瓿（分娩时用于腰麻以防低血压）
1.3 术前药物和短时手术的镇静剂	
阿托品	注射剂：1 mg（硫酸盐）1-ml安瓿
□ 地西泮	注射剂：5 mg/ml 2-ml安瓿 片剂：5 mg
吗啡	注射剂：10 mg（硫酸盐或盐酸盐）1-ml安瓿
异丙嗪	口服液：5 mg（盐酸盐）/5ml
2. 镇痛药，解热药，非甾体抗炎药（NSAIDs），治疗痛风的药物，以及治疗类风湿性疾病的药物（DMARDs）	
2.1 非阿片类药和非甾体抗炎药（NSAIDs）	
乙酰水杨酸	栓剂：50-150 mg 片剂：100-500 mg
布洛芬	片剂：200 mg，400 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

对乙酰氨基酚*	口服液： 125 mg/5ml 栓剂： 100 mg 片剂： 100-500 mg * 由于缺乏经证实的抗炎作用，不推荐用于此类用途
2.2 阿片类镇痛药	
可待因	片剂： 30 mg（磷酸盐）
吗啡	注射剂： 10 mg（吗啡盐酸盐或吗啡硫酸盐）1-ml安瓿 口服液： 10 mg（吗啡盐酸盐或吗啡硫酸盐）/5 ml 片剂： 10 mg（吗啡硫酸盐） 片剂（缓释）： 10 mg，30 mg，60 mg（吗啡硫酸盐）
2.3 治疗痛风用药	
别嘌醇	片剂： 100 mg
2.4 治疗类风湿性疾病使用的药物（DMARDs）	
氯喹	片剂： 100 mg，150 mg（作为磷酸盐或硫酸盐）
补充清单	
硫唑嘌呤	片剂： 50 mg
甲氨蝶呤	片剂： 2.5 mg（作为钠盐）
青霉胺	胶囊或片剂： 250 mg
柳氮磺吡啶	片剂： 500 mg
3. 抗过敏药和过敏性反应用药物	
<input type="checkbox"/> 氯苯那敏	注射剂： 10 mg（马来酸盐）1-ml安瓿 片剂： 4 mg（马来酸盐）
地塞米松	注射剂： 4 mg 磷酸地塞米松（作为二钠盐）1-ml安瓿
肾上腺素（副肾素）	注射剂： 1 mg（作为盐酸盐或酒石酸盐）1-ml 安瓿
氢化可的松	注射用粉剂： 100 mg（作为琥珀酸钠盐）小瓶
<input type="checkbox"/> 强的松龙*	片剂： 5 mg，25 mg * 无证据表明在大剂量使用时强的松龙与地塞米松之间完全的临床相似性。

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

4. 解毒药和中毒治疗中使用的其他药物	
4.1 非特异性药物	
活性炭	粉剂
4.2 特异性药物	
乙酰半胱氨酸	注射剂：200 mg/ml 10-ml 安瓿
阿托品	注射剂：1 mg（硫酸盐）1-ml 安瓿
葡萄糖酸钙	注射剂：100 mg/ml 10-ml 安瓿
去铁敏	注射用粉剂：500 mg（甲磺酸盐）小瓶
二巯丙醇	油性注射剂：50 mg/ml 2-ml 安瓿
DL-蛋氨酸	片剂：250 mg
亚甲蓝（次甲蓝，美蓝）	注射剂：10 mg/ml 10-ml 安瓿
纳络酮	注射剂：400 微克（盐酸盐）1-ml 安瓿
青霉胺	胶囊或片剂：250 mg
普鲁士蓝	口服粉剂
依地酸钙钠	注射剂：200 mg/ml 5-ml 安瓿
亚硝酸钠	注射剂：30 mg/ml 10-ml 安瓿
硫代硫酸钠	注射剂：250 mg/ml 50-ml 安瓿
5. 抗惊厥药/抗癫痫药	
卡马西平	口服液：100 mg/5ml 咀嚼片剂：100 mg，200mg 带刻痕片剂：100 mg，200 mg
□ 地西泮	注射剂：5 mg/ml 2-ml 安瓿（静脉或直肠给药）
硫酸镁*	注射剂：500 mg/ml 2-ml 安瓿；500 mg/ml 10-ml 安瓿 * 用于子痫和严重的先兆子痫而不是其它引起惊厥的病症。
苯巴比妥	注射剂：200 mg/ml（苯巴比妥钠） 口服液：15 mg/5ml（苯巴比妥）或 5ml（苯巴比妥钠） 片剂：15-100 mg（苯巴比妥）

世界卫生组织标准清单

苯妥英钠	胶囊: 25 mg, 50 mg, 100 mg (钠盐) 注射剂: 50 mg/ml 5-ml 安瓿 (钠盐) 口服液: 25-30mg/5ml* 片剂: 25 mg, 50 mg, 100 mg (钠盐) 咀嚼片剂: 50mg * 同一市场上同时存在25 mg/5 ml和30 mg/5 ml两种药力, 可引起处方和配药方面的混乱, 应当予以避免。
丙戊酸	口服液: 200 mg/5 ml 片剂 (可压碎的): 100 mg 肠溶片剂: 200 mg, 500 mg (丙戊酸钠)
补充清单	
乙琥胺	胶囊: 250 mg 口服液: 250 mg/5 ml
6. 抗感染药	
6.1 抗肠寄生虫药	
6.1.1 抗肠寄生虫药	
阿苯达唑	咀嚼片剂: 400 mg
左旋咪唑	片剂: 50 mg, 150 mg (作为盐酸盐)
□ 甲苯咪唑	咀嚼片剂: 100 mg, 500 mg
氯硝柳胺*	咀嚼片剂: 500 mg * 氯硝柳胺列入清单, 以便在吡喹酮治疗无效时使用
吡喹酮	片剂: 150 mg, 600 mg
噻嘧啶	口服液: 50 mg (作为双羟萘酸盐) /ml 咀嚼片剂: 250 mg (作为双羟萘酸盐)
6.1.2 抗丝虫药	
依维菌素	带刻痕片剂: 3 mg, 6 mg
补充清单	
乙胺嗪	片剂: 50 mg, 100 mg (枸橼酸盐)
舒拉明钠	注射用粉剂: 1 g 小瓶
6.1.3 抗血吸虫药和抗绦虫药	
吡喹酮	片剂: 600 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

三氯苯达唑	片剂：250 mg
补充清单	
奥沙尼唑*	胶囊： 250 mg 口服液： 250 mg/5ml *奥沙尼唑列入清单，以便在吡喹酮治疗无效时使用
6.2 抗菌药	
6.2.1 β-内酰胺类药物	
阿莫西林	胶囊或片剂： 250 mg，500 mg（无水） 口服液用粉剂： 125 mg（去结晶水）/5 ml
阿莫西林+克拉维酸	片剂： 500 mg + 125 mg
氨苄西林	注射用粉剂： 500 mg，1 g（作为钠盐）小瓶
苄星青霉素	注射用粉剂： 1.44 g 青霉素（=240万 IU）5-ml小瓶
青霉素类药	注射用粉剂： 600 mg（= 100万IU），3 g（=500万IU）（钠盐或钾盐）小瓶
头孢唑啉*	注射用粉剂： 1 g（作为钠盐）小瓶 * 用作手术预防措施
头孢克肟*	胶囊： 400 mg， * 列入清单只用于单剂量治疗不复杂的肛门-阴部淋病
<input type="checkbox"/> 邻氯青霉素	胶囊： 500 mg，1 g(作为钠盐) 注射用粉剂： 500 mg(作为钠盐)小瓶 口服液用粉剂： 125 mg（作为钠盐）/5 ml
青霉素V	口服液用粉剂： 250 mg（作为钾盐）/5 ml 片剂： 250 mg（作为钾盐）
普鲁卡因青霉素	注射用粉剂： 1 g（=100万 IU），3 g（=300万 IU）小瓶
补充清单	
头孢他啶	注射用粉剂： 250 mg（作为五水合物）小瓶
<input type="checkbox"/> 头孢曲松钠	注射用粉剂： 250 mg，1 g（作为钠盐）小瓶
亚胺培南* + 西拉司丁钠*	注射用粉剂： 250 mg（作为一水化物）+250 mg（作为钠盐），500 mg（作为一水化物）+500 mg（作为钠盐）小瓶 *列入清单仅用于治疗疑似或证实耐受多种药物感染引起的威胁生命的医院感染

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版 (2007 年 3 月)

6.2.2 其它抗菌药	
阿奇霉素*	胶囊: 250 mg或500 mg 口服液: 200 mg/5 ml * 列入清单的目的仅用于单一剂量治疗生殖道沙眼依原体和沙眼。
氯霉素	胶囊: 250 mg 注射用油性混悬液: 0.5 g (作为琥珀酸钠) /ml 2-ml安瓿 口服液: 150 mg (作为棕榈酸盐) /5 ml 注射用粉剂: 1 g (琥珀酸钠) 小瓶
<input type="checkbox"/> 环丙沙星*	片剂: 250 mg (作为盐酸盐) * 最终选择取决于使用的适应症
多西环素*	胶囊或片剂: 100 mg (盐酸盐) * 最终选择取决于使用的适应症
<input type="checkbox"/> 红霉素	胶囊或片剂: 250 mg (作为硬脂酸盐或琥珀酸乙酯) 注射用粉剂: 500 mg (作为乳糖醛酸盐) 小瓶 口服液用粉剂: 125 mg (作为硬脂酸盐或琥珀酸乙酯)
<input type="checkbox"/> 庆大霉素*	注射剂: 10 mg, 40 mg (作为硫酸盐) /ml 2-ml安瓿 * 最终选择取决于使用的适应症
<input type="checkbox"/> 甲硝唑	注射剂: 500 mg 100-ml安瓿 口服液: 200 mg (作为苯甲酸盐) /5 ml 栓剂: 500 mg, 1 g 片剂: 200-500 mg
呋喃妥因	片剂: 100 mg
大观霉素	注射用粉剂: 2 g (作为盐酸盐) 小瓶
磺胺甲恶唑 + 甲氧苄啶	注射剂: 80 mg + 16 mg/ml 5-ml和10-ml 安瓿 口服液: 200 mg + 40 mg/5 ml 片剂: 100 mg + 20 mg, 400 mg + 80 mg
甲氧苄啶	片剂: 100 mg, 200 mg
补充清单	
克林霉素	胶囊: 150 mg 注射剂: 150 mg (作为磷酸盐) /ml
磺胺嘧啶	注射剂: 250 mg (钠盐) 4-ml安瓿 片剂: 500 mg
万古霉素	注射用粉剂: 250 mg (作为盐酸盐) 小瓶

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

6.2.3 抗麻风药	
应联合用药，永远不单独使用治疗麻风的药物。联合疗法对于防止产生耐药性至关重要。应使用彩色编码的透明塑料袋（多种药物联合化疗透明塑料袋），其中包含成人和儿童期麻风的两种药物（少菌型麻风）或三种药物（多菌型麻风）标准组合。多种药物联合化疗透明塑料袋可通过世界卫生组织免费提供。	
氯法齐明	胶囊：50 mg，100 mg
氨苯砜	片剂：25 mg，50 mg，100 mg
利福平	胶囊或片剂：150 mg，300 mg
6.2.4 抗结核药	
乙胺丁醇	片剂：100 mg-400 mg（盐酸盐）
异烟肼	片剂：100 -300 mg 带刻痕片剂：50 mg
异烟肼 + 乙胺丁醇	片剂：150 mg + 400 mg
吡嗪酰胺	片剂：400 mg 分散片剂：150 mg 带刻痕片剂：150 mg
利福平	胶囊或片剂：150 mg，300 mg
利福平 + 异烟肼	片剂： 60 mg + 30 mg; 150 mg + 75 mg; 300 mg + 150 mg 60 mg + 60 mg（每周3次，间歇性使用） 150 mg + 150 mg（每周3次，间歇性使用）
利福平 + 异烟肼 + 乙胺丁醇	片剂：150 mg + 75 mg + 275 mg
利福平 + 异烟肼 + 吡嗪酰胺	片剂： 60 mg + 30 mg + 150 mg; 150 mg + 75 mg + 400 mg 150 mg + 150 mg + 500 mg（每周3次，间歇性使用）
利福平 + 异烟肼 + 吡嗪酰胺 + 乙胺丁醇	片剂：150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg
链霉素	注射用粉剂：1 g（作为硫酸盐）小瓶
补充清单	
为治疗多重耐药结核病(MDR-TB)保留的二线药物,应在符合世界卫生组织结核病控制标准的专门中心使用。	
阿米卡星	注射用粉剂：1000 mg 小瓶

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

对氨基水杨酸	颗粒剂: 4 g 小袋 片剂: 500 mg,
卷曲霉素	注射用粉剂: 1000 mg 小瓶
环丝氨酸	胶囊或片剂: 250 mg
乙硫异烟胺	片剂: 125 mg, 250 mg
卡那霉素	注射用粉剂: 1000 mg 小瓶
氧氟沙星*	片剂: 200 mg, 400 mg *根据可得性和规划方面的考虑, 左氟沙星可作为替代药物
6.3 抗真菌药	
克霉唑	阴道软膏: 1%, 10% 阴道片剂: 100 mg, 500 mg
<input type="checkbox"/> 氟康唑	胶囊: 50 mg 注射剂: 2 mg/ml 安瓿 口服液: 50 mg/5-ml
灰黄霉素	胶囊或片剂: 125 mg, 250 mg
制霉菌素	含化片剂: 100 000 IU 阴道栓剂: 100 000 IU 片剂: 100 000, 500 000 IU
补充清单	
两性霉素B	注射用粉剂: 50 mg 小瓶
氟胞嘧啶	胶囊: 250 mg 静脉滴注用: 2.5 g 250 ml
碘化钾	饱和溶液
6.4 抗病毒药	
6.4.1 抗疱疹病毒药	
<input type="checkbox"/> 阿昔洛韦	注射用粉剂: 250 mg (钠盐) 小瓶 片剂: 200 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

6.4.2 抗逆转录病毒药	
根据现有证据和使用经验，列入以下三类抗逆转录病毒药物作为治疗和预防艾滋病毒（预防母婴传播和作为接触后预防）的基本药物。委员会强调根据全球和国家准则使用这些药物的重要性。委员会建议并批准使用固定剂量的复合剂，并开发适宜的固定剂量新复合剂。这包括改进的剂型、非冷藏制剂和儿童剂型，并确保药物质量。	
6.4.2.1 核苷类逆转录酶抑制剂	
阿巴卡韦（ABC）	口服液：100 mg（作为硫酸盐）/5ml 片剂：300 mg（作为硫酸盐）
惠妥滋（地丹诺辛，ddI）	缓冲口服冲剂：100 mg，167 mg，250 mg 包装 非缓冲的肠溶包衣胶囊：125 mg，200 mg，250 mg，400 mg 缓冲咀嚼片：25 mg，50 mg，100 mg，150 mg，200 mg
恩曲他滨（FTC）*	胶囊：200 mg 口服液：10 mg/ml * 根据抗逆转录病毒药物药理学、抗药模式和临床试用方面的知识，FTC可接受作为3TC的替代药物
拉米夫定（3TC）	口服液：50 mg/5ml 片剂：150 mg
斯塔夫定（d4T）	胶囊：15 mg，20 mg，30 mg，40 mg* * 委员会预计在下次会议上对本剂型进行审评，可能删除 口服液用粉剂：5 mg/5ml
替诺福韦酯（TDF）	片剂：300 mg（替诺福韦酯 - 等同于245 mg替诺福韦）
齐多夫定（ZDV或AZT）	胶囊：100 mg，250 mg 口服液：50 mg/5ml 静脉注射剂：10 mg/ml 20-ml安瓿 片剂：300 mg
6.4.2.2 非核苷类逆转录酶抑制剂	
依非韦伦（EFV或EFZ）	胶囊：50 mg，100 mg，200 mg 口服液：150 mg/5ml 片剂：600 mg
奈韦拉平（NVP）	口服液：50 mg/5-ml 片剂：200 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

6.4.2.3 蛋白酶抑制剂	
<p>从标准清单中选择蛋白酶抑制剂，需由各国根据国际和国家临床指南和经验作出决定。建议将利托那韦与其它药物一起联合使用，作为一种药物增强剂，而不是单独使用的抗逆转录病毒药物。</p> <p>本节将在下次委员会会议上作为一个优先事项复审。预计将为下次会议提交关于含有200/50 mg 罗品那韦 + 利托那韦的一种耐热片剂配方的申请。</p>	
印地那韦（IDV）	胶囊： 200 mg， 333 mg， 400 mg（作为硫酸盐）
罗品那韦+ 利托那韦（LPV/r）	胶囊： 133.3mg + 33.3mg 口服液： 400mg+ 100 mg/5ml
那非那韦（NFV）	口服散剂： 50 mg/g 片剂： 250 mg（作为甲磺酸盐）
利托那韦	口服液： 400 mg/5ml 固体口服剂型： 100 mg
沙奎那韦（SQV）	胶囊： 200 mg
固定剂量复合剂	
依非韦伦 + 恩曲他滨* + 替诺福韦	片剂： 600 mg + 200 mg + 300 mg * 根据抗逆转录病毒药物药理学、抗药模式和临床试用方面的知识，FTC可接受作为3TC的替代药物
恩曲他滨* + 替诺福韦	片剂： 200 mg + 300 mg * 根据抗逆转录病毒药物药理学、抗药模式和临床试用方面的知识，FTC可接受作为3TC的替代药物
斯塔夫定 + 拉米夫定 + 奈韦拉平	片剂： 30 mg + 150 mg + 200 mg
齐多夫定 + 拉米夫定	片剂： 300 mg + 150 mg
齐多夫定 + 拉米夫定 + 奈韦拉平	片剂： 300 mg + 150 mg + 200 mg
6.4.3 其它抗病毒药物	
利巴韦林	静脉注射剂： 1000 mg和800 mg 加入10-ml磷酸缓冲溶液 固体口服剂型： 200 mg， 400 mg， 600 mg
6.5 抗原虫药	
6.5.1 抗阿米巴药和抗蓝氏贾第虫药	
二氯尼特	片剂： 500 mg（糠酸盐）

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

□ 甲硝唑	注射剂： 500 mg 100-ml小瓶装 口服液： 200 mg（作为苯甲酸盐）/5 ml 片剂： 200-500 mg
6.5.2 抗黑热病药	
□ 葡甲胺锑盐	注射剂： 30%，相当于约8.1%的锑，5-ml安瓿
巴龙霉素	肌肉注射剂： 750 mg巴龙霉素基作为硫酸盐
补充清单	
两性霉素 B	注射用粉剂： 50 mg 小瓶
喷他咪（戊烷咪）	注射用粉剂： 200 mg，300 mg（羟乙基磺酸盐）小瓶
6.5.3 抗疟药	
6.5.3.1 治疗用	
治疗恶性疟原虫疟疾病例的药物应联合使用。本清单目前根据临床指南建议联合使用。委员会认识到这些固定剂量复合剂并不都已存在，并鼓励进行研制和严格的测试。委员会还鼓励研制和测试直肠给药配方。	
阿莫地喹*	片剂， 153 mg或200 mg（作为盐酸盐） * (a) 与50mg青蒿琥酯联合应用或(b) 单独使用以治疗间日疟原虫、卵形疟原虫和三日疟原虫感染
蒿甲醚	油性注射剂： 80 mg/ml的1-ml安瓿 用于管理严重的疟疾
蒿甲醚 + 本芴醇*	片剂， 20 mg + 120 mg *建议不用于孕期最初三个月或5公斤以下儿童
青蒿琥酯*	注射剂： 含60 mg无水青蒿酸的安瓿，并有含5%碳酸氢钠溶液的单独安瓿。 用于管理严重的疟疾 片剂： 50 mg * 与阿莫地喹、甲氟喹或磺胺多辛 + 乙胺嘧啶联合应用
氯喹*	口服液： 50 mg（作为磷酸盐或硫酸盐）/5 ml 片剂： 100 mg，150 mg（作为磷酸盐或硫酸盐） * 仅用于治疗间日疟原虫感染
多西环素*	胶囊： 100 mg（作为盐酸盐） 分散片： 100 mg（作为一水化物） * 只与奎宁联合应用

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

甲氟喹*	片剂： 250 mg（作为盐酸盐） * 与50 mg青蒿琥酯联合应用
伯胺喹*	片剂： 7.5 mg， 15 mg（作为二磷酸盐） * 仅用于彻底根治间日疟原虫和卵形疟原虫感染，服药14天。
奎宁*	注射剂： 300 mg 盐酸奎宁/ml的2-ml安瓿 片剂： 300 mg（硫酸奎宁）或300 mg（重硫酸奎宁） * 仅用于管理严重的疟疾，应当与多西环素联合应用
磺胺多辛 + 乙胺嘧啶*	片剂： 500 mg + 25 mg * 只与50 mg青蒿琥酯联合应用
6.5.3.2 预防用药	
氯喹*	口服液： 50 mg（作为磷酸盐或硫酸盐）/5 ml 片剂： 150 mg（作为盐酸盐或硫酸盐） * 仅于中美洲区域使用，用于间日疟原虫
多西环素	胶囊或片剂： 100 mg（盐酸盐）
甲氟喹	片剂： 250 mg（作为盐酸盐）
百乐君*	片剂： 100 mg（盐酸盐） * 只与氯喹联合应用
6.5.4 抗肺囊虫病药和抗弓形体病药	
乙胺嘧啶	片剂： 25 mg
磺胺甲恶唑 + 甲氧苄啶	注射剂： 80 mg + 16 mg/ml 5-ml安瓿， 80 mg + 16 mg/ml 10-ml 安瓿
补充清单	
喷他脒	片剂： 200 mg， 300 mg
6.5.5. 抗锥虫病药	
6.5.5.1 非洲锥虫病	
非洲锥虫病1期治疗药物	
喷他脒*	注射用粉剂： 200 mg（依西喷他脒）小瓶 * 用于治疗布氏冈比亚锥虫感染
舒拉明钠*	注射用粉剂， 1 g小瓶 * 专用于布氏罗德西亚锥虫感染初期治疗
非洲锥虫病2期治疗药物	
依氟鸟氨酸	注射剂： 200 mg（盐酸盐）100-ml瓶装

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版 (2007 年 3 月)

美拉唑醇	注射剂: 3.6%溶液5-ml安瓿 (有效成分180 mg)
6.5.5.2 美洲锥虫病	
苄硝唑	片剂: 100 mg
硝呋莫司	片剂: 30 mg, 120 mg, 250 mg
7. 抗偏头痛药	
7.1 治疗急性发作药物	
乙酰水杨酸	片剂: 300 -500 mg
对乙酰氨基酚	片剂: 300-500 mg
7.2 预防用药	
□ 普萘洛尔	片剂: 20 mg, 40 mg (盐酸盐)
8. 抗肿瘤药, 免疫抑制剂和姑息治疗用药物	
8.1 免疫抑制药	
补充清单	
硫唑嘌呤	注射用粉剂: 100 mg (作为钠盐) 小瓶 片剂: 50 mg
环孢素	胶囊: 25 mg 注射用浓缩剂: 50 mg/ml的1-ml安瓿, 用于器官移植
8.2 细胞毒性药物	
本节预计将在下次会议上复审	
补充清单	
门冬酰胺酶	注射用粉剂: 10 000 IU 小瓶
平阳霉素	注射用粉剂: 15 mg (作为硫酸盐) 小瓶
亚叶酸钙	注射剂: 3 mg/ml的10-ml安瓿 片剂: 15 mg
苯丁酸氮芥	片剂: 2 mg
顺铂	注射用粉剂: 10 mg, 50 mg 小瓶
环磷酰胺	注射用粉剂: 500 mg 小瓶 片剂: 25 mg
阿糖胞苷	注射用粉剂: 100 mg 小瓶
达卡巴嗪	注射用粉剂: 100 mg 小瓶

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

放线菌素	注射用粉剂: 500 微克 小瓶
柔红霉素	注射用粉剂: 50 mg（作为盐酸盐）小瓶
阿霉素	注射用粉剂: 10 mg, 50 mg（盐酸盐）小瓶
依托泊苷	胶囊: 100 mg 注射剂: 20 mg/ml 的 5-ml 安瓿
氟尿嘧啶	注射: 50 mg/ml 的 5-ml 安瓿
巯嘌呤	片剂: 50 mg
甲氨蝶呤	注射用粉剂: 50 mg（作为钠盐）小瓶 片剂: 2.5 mg（作为钠盐）
丙卡巴肼	胶囊: 50 mg（作为盐酸盐）
长春碱	注射用粉剂: 10 mg（硫酸盐）小瓶
长春新碱	注射用粉剂: 1 mg, 5 mg（硫酸盐）小瓶
8.3 激素和抗激素药物	
补充清单	
地塞米松	注射剂: 4 mg 磷酸地塞米松（作为二钠盐），1-ml 安瓿
氢化可的松	注射用粉剂: 100 mg（作为琥珀酸钠盐）小瓶
泼尼松龙*	片剂: 5 mg, 25 mg *无证据表明在大剂量使用时泼尼松龙与地塞米松之间完全的临床相似性。
他莫昔芬	片剂: 10 mg, 20 mg（作为枸橼酸酯）
8.4 姑息治疗用药物	
世卫组织专家委员会认识到把特定药物列入姑息治疗部分的重要性。目前用于姑息治疗的一些药物按其治疗作用，例如镇痛，列入标准清单的有关部分。有必要更新上一份清单中用作参考的姑息治疗指南。委员会预计将为下一次会议提交关于姑息治疗所需药物的申请。	
9. 抗巴金森氏病药物	
比哌立登	注射剂: 5 mg（乳酸盐）1-ml 安瓿 片剂: 2 mg（盐酸盐）
左旋多巴 + 卡比多巴	片剂: 100 mg + 10 mg, 250 mg + 25 mg
10. 影响血液的药物	
10.1 抗贫血药	
亚铁盐	口服液: 相当于 25 mg 铁（作为硫酸盐）/ml 片剂: 相当于 60 mg 铁

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

亚铁盐 + 叶酸	片剂：相当于60 mg铁 + 400微克叶酸（孕期营养补充）
叶酸	片剂：1mg, 5 mg
羟钴铵	注射剂：1 mg 1-ml安瓿
10.2 影响凝血的药物	
肝素钠	注射剂：1000 IU/ml, 5000 IU/ml, 20,000 IU/ml 1-ml安瓿
维生素K	注射剂：10 mg/ml 5-ml安瓿 片剂：10 mg
硫酸鱼精蛋白	注射剂：10 mg/ml 5-ml安瓿
<input type="checkbox"/> 华法林	片剂：1 mg, 2 mg, 5 mg（钠盐）
11. 血液制品和血浆替代品	
11.1 血浆替代品	
<input type="checkbox"/> 右旋糖酐 70*	可注射溶液：6%， * 聚明胶肽，可注射溶液，3.5%为相当值
11.2 特殊用途的血浆成分	
所有血浆成分应符合世界卫生组织关于血液、血液制品、血液成分、血浆衍生物的采集、加工和质量控制的要求（1992年修订）。（世界卫生组织技术报告系列，840号，1994年，附件2）。	
补充清单	
人免疫球蛋白	肌肉注射：16%蛋白溶液 静脉注射：5%，10%蛋白溶液
<input type="checkbox"/> 浓缩第VIII因子	干燥的
<input type="checkbox"/> 浓缩的第IX因子复合物（凝血因子，第II、VII、IX、X因子）	干燥的
12. 心血管药物	
12.1 抗心绞痛药	
<input type="checkbox"/> 阿替洛尔	片剂：50 mg, 100 mg
硝酸甘油	片剂（舌下）：500微克
<input type="checkbox"/> 硝酸异山梨醇	片剂（舌下）：5 mg
<input type="checkbox"/> 维拉帕米	片剂：40 mg, 80 mg（盐酸盐）
12.2 抗心率不齐药	
这一小节将在下次专家委员会会议上复审	
<input type="checkbox"/> 阿替洛尔	片剂：50 mg, 100 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

地高辛	注射剂： 250微克/ml 2-ml安瓿 口服液： 50微克/ml 片剂： 62.5微克，250微克
肾上腺素（副肾素）	注射剂： 100微克/ml（作为酒石酸或盐酸盐）10-ml安瓿
利多卡因	注射剂： 20 mg（盐酸盐）/ml 5-ml安瓿
维拉帕米	注射剂： 2.5 mg（盐酸盐）/ml 2-ml安瓿 片剂： 40 mg，80 mg（盐酸盐）
补充清单	
<input type="checkbox"/> 普鲁卡因胺	注射剂： 100 mg（盐酸盐）/ml 10-ml安瓿
<input type="checkbox"/> 奎尼丁	片剂： 200 mg（硫酸盐）
12.3 抗高血压药	
<input type="checkbox"/> 氨氯地平	片剂： 5 mg
<input type="checkbox"/> 阿替洛尔	片剂： 50 mg，100 mg
<input type="checkbox"/> 依那普利	片剂： 2.5 mg
肼苯达嗪*	注射用粉剂： 20mg（盐酸盐）安瓿 片剂： 25mg，50mg（盐酸盐） * 将肼苯达嗪列入清单的目的是仅用于重度妊娠高血压的急性管理。鉴于已有更多证据表明其它药物的疗效和安全性，不建议将其用于治疗原发性高血压。
<input type="checkbox"/> 氢氯噻嗪	带刻痕片剂： 25 mg
甲基多巴*	片剂： 250 mg * 将甲基多巴列入清单的目的是用于管理仅由妊娠引发的高血压。鉴于已有较多证据表明其它药物的疗效和安全性，不建议将其用于治疗原发性高血压。
补充清单	
硝普钠	静脉滴注用粉剂： 50 mg 安瓿
12.4 心力衰竭用药	
本小节将在下次专家委员会会议上复审	
地高辛	注射剂： 250微克/ml 2-ml安瓿 口服液： 50微克/ml 片剂： 62.5微克，250微克；
<input type="checkbox"/> 依那普利	片剂： 2.5 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

呋塞米	注射剂：10 mg/ml 2-ml 安瓿 片剂：40 mg
<input type="checkbox"/> 氢氯噻嗪	带刻痕片剂：25 mg
补充清单	
多巴胺	注射剂：40 mg（盐酸盐）5-ml 小瓶
12.5 抗血栓药	
乙酰水杨酸	片剂：100 mg
补充清单	
链激酶	注射用粉剂：150 万 IU 小瓶
12.6 降脂药	
<input type="checkbox"/> 辛伐他汀*	片剂：5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg * 用于高危病人
13. 皮肤病用药（局部）	
13.1 抗真菌药	
苯甲酸 + 水杨酸	软膏或霜剂：6% + 3%
<input type="checkbox"/> 咪康唑	软膏或霜剂：2%（硝酸盐）
硫代硫酸钠	溶液：15%
补充清单	
硫化硒	以清洁剂为基础的混悬液：2%
13.2 抗感染药	
<input type="checkbox"/> 甲紫（龙胆紫）	水溶液：0.5% 酊剂：0.5%
硫酸新霉素 + <input type="checkbox"/> 杆菌肽	软膏：5 mg 硫酸新霉素 + 250 IU 杆菌肽/g
高锰酸钾	水溶液：1:10 000
磺胺嘧啶银	霜剂：1%，500-g 容器包装
13.3 抗炎药和止痒药	
<input type="checkbox"/> 倍他米松	软膏或霜剂：0.1%（作为戊酸盐）
<input type="checkbox"/> 炉甘石洗剂	洗剂
<input type="checkbox"/> 氢化可的松	软膏或霜剂：1%（醋酸酯）
13.4 收敛药	
二乙酸铝	溶液：5% 稀释用

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

13.5 影响皮肤分化和增殖的药物	
过氧化苯酰	洗剂或霜剂： 5%
煤焦油	溶液： 5%
地蒽酚	油膏： 0.1%-2%
氟尿嘧啶	油膏： 5%
<input type="checkbox"/> 鬼臼脂	溶液： 10-25%
水杨酸	溶液： 5%
尿素	油膏或霜剂： 10%
13.6 杀疥药和杀虱药	
<input type="checkbox"/> 苯甲酸苄酯	洗剂： 25%
二氯苯醚菊酯	霜剂： 5% 洗剂： 1%
14. 诊断剂	
14.1 眼科用药	
荧光素	眼药水： 1%（钠盐）
<input type="checkbox"/> 托吡卡胺	眼药水： 0.5%
14.2 放射性对比介质	
<input type="checkbox"/> 泛影酸	注射剂： 140-420 mg 碘（作为钠盐或葡甲胺盐）/ml 20-ml 安瓿
硫酸钡	水性混悬液
<input type="checkbox"/> 碘苯六醇	注射剂： 140 –350 mg 碘/ml 5-ml， 10-ml 和 20-ml 安瓿
补充清单	
<input type="checkbox"/> 碘托葡胺	溶液： 5-8 g 碘化物， 100-250 ml
15. 消毒剂和防腐剂	
15.1 防腐剂	
<input type="checkbox"/> 氯己定	溶液： 5%（二葡萄糖酸钠）稀释用
<input type="checkbox"/> 乙醇	溶液： 70%（变性的）
<input type="checkbox"/> 碘化聚烯吡酮	溶液： 10%
15.2 消毒剂	
<input type="checkbox"/> 含氯化合物	粉剂：（0.1% 氯）配溶液用
<input type="checkbox"/> 氯二甲苯酚	溶液： 4.8%
戊二醛	溶液： 2%

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

16. 利尿剂	
阿米洛利	片剂：5 mg（盐酸盐）
<input type="checkbox"/> 呋塞米	注射剂：10 mg/ml 2-ml 安瓿 片剂：40 mg
<input type="checkbox"/> 氢氯噻嗪	带刻痕片剂：25 mg
甘露醇	可注射溶液：10%，20%
螺内酯	片剂：25 mg
17. 胃肠用药	
17.1 抗酸剂和其他抗溃疡药	
氢氧化铝	口服液：320 mg/5 ml 片剂：500 mg
<input type="checkbox"/> 雷尼替丁	注射剂：25 mg/ml 2-ml 安瓿 口服液：75 mg/5-ml 片剂：150 mg（作为盐酸盐）
氢氧化镁	口服液：相当于 550 mg 氧化镁/10 ml
17.2 止吐药	
甲氧氯普胺	注射剂：5 mg（盐酸盐）/ml 2-ml 安瓿 片剂：10 mg（盐酸盐）
异丙嗪	注射剂：25 mg（盐酸盐）/ml 2-ml 安瓿 口服液：5 mg（盐酸盐）/5 ml 片剂：10 mg，25 mg（盐酸盐）
17.3 抗炎药	
<input type="checkbox"/> 柳氮磺吡啶	保留灌肠 栓剂：500 mg 片剂：500 mg
补充清单	
<input type="checkbox"/> 氢化可的松	保留灌肠 栓剂：25 mg（醋酸酯） (<input type="checkbox"/> 只适用于氢化可的松保留灌肠)
17.4 泻药	
<input type="checkbox"/> 番泻叶	片剂：7.5 mg（番泻叶甙）（或传统剂型）

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

17.5 腹泻用药	
17.5.1 口服补液	
口服补液盐*	葡萄糖： 75mEq（毫克当量） 钠： 75mEq或mmol（毫克分子）/l 氯化物： 65mEq或mmol/l 钾： 20mEq或mmol/l 枸橼酸盐： 10mmol/l 容积渗透克分子浓度： 245mOsm（毫渗克分子）/l 葡萄糖： 13.5 g/l 氯化钠： 2.6 g/l 氯化钾： 1.5 g/l 二水枸橼酸三钠+： 2.9 g/l + 二水枸橼酸三钠可以碳酸氢钠2.5 g/l替代。但是，在热带条件下，这后一制剂的稳定性极差，因此仅建议在生产后立即使用。 * 在霍乱病例中可能需要更高的钠浓度
17.5.2 儿童治腹泻药	
硫酸锌*	口服液： 剂型为每单位10 mg 片剂： 剂型为每单位10 mg * 在急性腹泻时硫酸锌应作为口服补液盐的辅助药物使用
17.5.3 抗成人（症状性）腹泻药	
可待因*	片剂： 30 mg（磷酸盐） * 此药的作用受到质疑，是否继续纳入清单，将在下次专家委员会会议上复审
18. 激素，其他内分泌药物和避孕药	
18.1 肾上腺激素和合成的替代物	
艾迪生病是一种极少见的情况；肾上腺激素已列入第3节。	
18.2 雄性激素	
补充清单	
睾丸酮	注射剂： 200 mg（庚酸酯）的1-ml安瓿
18.3 避孕药	
18.3.1 口服激素避孕药	
<input type="checkbox"/> 炔雌醇 + <input type="checkbox"/> 左炔诺孕酮	片剂： 30微克 + 150微克
<input type="checkbox"/> 炔雌醇 + <input type="checkbox"/> 炔诺酮	片剂： 35微克 + 1.0 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

左炔诺孕酮	片剂：30 微克，750 微克（每袋 2 片），1.5 mg
18.3.2 可注射激素避孕药	
甲羟孕酮	长效注射剂：150 mg/ml 1ml 安瓿
甲羟孕酮 + 环戊丙酸雌二醇	注射剂：25 mg + 5 mg
庚炔诺酮	油性溶液：200 mg/ml 的 1-ml 安瓿
18.3.3 宫内节育器	
铜制宫内节育器	
18.3.4 屏障方法	
安全套	
阴道隔膜	
18.3.5 植入性避孕药	
左炔诺孕酮缓释埋植剂	双棍左炔诺孕酮缓释埋植剂，每根棍含左炔诺孕酮 75 mg（总共 150 mg）
18.4 雌激素	
□ 炔雌醇*	片剂：10 微克，50 微克 * 此药的公共卫生针对性和/或相对效果和/或安全性受到质疑，将在下次专家委员会会议上复审是否继续列入清单。
18.5 胰岛素和其他抗糖尿病药	
格列苯脲	片剂：2.5 mg，5 mg
胰岛素注射液（水溶性）	注射剂：40 IU/ml 10-ml 小瓶，100 IU/ml 10-ml 小瓶
中效胰岛素	注射剂：40 IU/ml 10 ml 小瓶，100 IU/ml 10 ml 小瓶（作为胰岛素锌化合物混悬液，或低精蛋白胰岛素）
甲福明	片剂：500 mg（盐酸盐）
18.6 促排卵剂	
补充清单	
氯米芬	片剂：50 mg（枸橼酸盐）
18.7 黄体激素	
炔诺酮*	片剂：5 mg * 该药物的公共卫生相关性和/或相对效果和/或安全性受到质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于清单。

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

补充清单	
醋酸甲羟孕酮*	片剂: 5 mg * 该药物的公共卫生相关性和/或相对效果和/或安全性受到质疑，将在专家委员会下一次会议上审查是否继续将其列于清单。
18.8 甲状腺激素和抗甲状腺药	
左甲状腺素	片剂: 50微克, 100微克 (钠盐)
碘化钾	片剂: 60 mg
<input type="checkbox"/> 丙硫氧嘧啶	片剂: 50 mg
19. 免疫制剂	
19.1 诊断试剂	
所有结核菌素应符合世界卫生组织关于结核菌素的要求（1985年修订）。世界卫生组织生物制品标准化专家委员会的第36次报告（世界卫生组织 技术报告系列，745号，1987年，附件1）。	
结核菌素, 纯蛋白衍生物 (PPD)	注射剂
19.2 血清和免疫球蛋白	
所有血浆成分应符合世界卫生组织关于血液、血液成分、血浆衍生物的采集、加工和质量控制的要求（1992年修订）。世界卫生组织生物制品标准化专家委员会第43次报告（世界卫生组织技术报告系列，840号，1994年，附件2）。	
抗-D 免疫球蛋白 (人)	注射剂: 250微克 单剂, 小瓶
抗破伤风免疫球蛋白 (人)	注射剂: 500 IU小瓶
抗蛇毒免疫蛋白*	注射剂 * 准确类型由当地确定
白喉抗毒素	注射剂: 10 000 IU, 20 000 IU小瓶
<input type="checkbox"/> 狂犬病免疫球蛋白	注射剂: 150 IU/ml小瓶
19.3 疫苗	
从标准清单选用疫苗将需要每个国家在考虑国际建议、流行病学和国家优先事项之后作出决定。以下清单详细列出免疫战略咨询专家组 (SAGE) (http://www.who.int/immunization/sage_conclusions/en/index.html) 提出建议和/或世卫组织有立场文件 (http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html) 的疫苗。网站在发表新的立场文件时将更新，并含有最近的信息和建议。 所有疫苗应符合世界卫生组织关于生物物质的要求。	

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

卡介苗	
霍乱疫苗	
白喉类毒素	
甲型肝炎疫苗	
乙型肝炎疫苗	
乙型流感嗜血杆菌疫苗	
流感疫苗	
乙型脑炎疫苗	
麻疹疫苗	
脑膜炎球菌脑膜炎菌苗	
腮腺炎疫苗	
百日咳菌苗	
肺炎球菌疫苗	
脊髓灰质炎疫苗	
狂犬病疫苗	
轮状病毒疫苗	
风疹疫苗	
破伤风类毒素	
伤寒菌苗	
水痘疫苗	
黄热病疫苗	
20. 肌肉松弛剂（外周作用）和胆碱酯酶抑制剂	
<input type="checkbox"/> 阿库氯铵	注射剂： 5 mg（氯化物）/ml 2-ml安瓿
新斯的明	注射剂： 500微克 1-ml安瓿， 2.5 mg（甲磺酸盐） 1-ml安瓿 片剂： 15 mg（溴化物）
琥珀胆碱	注射剂： 50 mg（氯化物）/ml 2-ml安瓿 注射用粉剂： 小瓶
补充清单	
吡斯的明	注射剂： 1 mg 1-ml 安瓿 片剂： 60 mg（溴化物）

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

<input type="checkbox"/> 维库溴铵	注射用粉剂: 10 mg（溴化物）小瓶
21. 眼科制剂	
本节将在下次专家委员会会议上复审	
21.1 抗感染剂	
阿昔洛韦	油膏: 3% W/W
<input type="checkbox"/> 庆大霉素*	溶液（眼药水）: 0.3%（硫酸盐） * 最终选择取决于使用的适应症
<input type="checkbox"/> 四环素	眼药膏: 1%（盐酸盐）
21.2 抗炎剂	
<input type="checkbox"/> 强的松龙	溶液（眼药水）: 0.5%（磷酸钠）
21.3 局部麻醉药	
<input type="checkbox"/> 丁卡因	溶液（眼药水）: 0.5%（盐酸盐）
21.4 缩瞳剂和抗青光眼药	
乙酰唑胺	片剂: 250 mg
<input type="checkbox"/> 毛果芸香碱	溶液（眼药水）: 2%，4%（盐酸盐或硝酸盐）
<input type="checkbox"/> 噻吗洛尔	溶液（眼药水）: 0.25%，0.5%（作为马来酸）
21.5 散瞳剂	
阿托品	溶液（眼药水）: 0.1%，0.5%，1%（硫酸盐）
<i>补充清单</i>	
肾上腺素（副肾素）	溶液（眼药水）: 2%（作为盐酸盐）
22. 催产药和抗催产药	
22.1 催产药	
<input type="checkbox"/> 麦角新碱	注射剂: 200微克（氢马来酸盐），1-ml安瓿
催产素	注射剂: 10 IU 1-ml安瓿
<i>补充清单</i>	
米索前列醇	阴道片剂: 25 微克

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

米非司酮* - 米索前列醇*	片剂200 mg-片剂200微克 *要求密切医务监督
在国家法律允许及文化上可以接受的地方	
22.2 抗催产药（宫缩缓解剂）	
硝苯地平	立即释放胶囊：10 mg
23. 腹膜透析液	
补充清单	
腹膜内透析液（适当配方）	肠外（静脉注射）用溶液
24. 精神治疗药	
24.1 精神病用药	
<input type="checkbox"/> 氯丙嗪	注射剂：25 mg（盐酸盐）/ml 2-ml安瓿 口服液：25 mg（盐酸盐）/5ml 片剂：100 mg（盐酸盐）
<input type="checkbox"/> 癸氟奋乃静	注射剂：25 mg（癸酸酯或庚酸酯）1-ml安瓿
<input type="checkbox"/> 氟哌啶醇	注射剂：5 mg 1-ml安瓿 片剂：2 mg，5 mg
24.2 情感性疾病用药	
24.2.1 抑郁性疾病用药	
<input type="checkbox"/> 阿米替林	片剂：25 mg（盐酸盐）
氟西汀	胶囊或片剂：20 mg（作为盐酸盐）
24.2.2 双极情感性疾病用药	
卡马西平	带刻痕片剂：100 mg，200 mg
碳酸锂	胶囊或片剂：300 mg
丙戊酸	肠溶片：200 mg，500 mg（丙戊酸钠）
24.3 全身性焦虑和睡眠障碍性疾病用药	
<input type="checkbox"/> 地西泮	带刻痕片剂：2 mg，5 mg

基本药物 世界卫生组织标准清单

第 15 版（2007 年 3 月）

24.4 强迫性疾病和发作性疼痛用药	
氯米帕明	胶囊：10 mg，25 mg（盐酸盐）
24.5 物质依赖规划用药	
补充清单	
□ 美沙酮*	浓缩口服液： 5 mg/ml, 10 mg/ml (盐酸盐) 口服液： 5 mg/5ml, 10 mg/5ml <i>*增加方框以包括丁丙诺啡。这些药只在已建立的支持规划内使用。</i>
25. 作用于呼吸道的药物	
25.1 抗哮喘和慢性阻塞性肺病药物	
□ 倍氯米松	吸入剂（气溶胶）：每剂50微克（二丙酸酯），每剂250微克（二丙酸酯）
肾上腺素（副肾素）	注射剂：1 mg（作为盐酸盐或氢酒石酸盐）1-ml安瓿
异丙托溴铵	吸入剂（气溶胶）：20微克/配定剂量
□ 沙丁胺醇	吸入剂（气溶胶）：每剂100微克（作为硫酸盐） 注射剂：50微克（作为硫酸盐）/ml 5-ml安瓿 口服液：2 mg/5 ml 用于喷雾器的呼吸面罩溶液：5 mg（作为硫酸盐）/ml 片剂：2 mg，4 mg（作为硫酸盐）
25.2 作用于呼吸道的其它药物	
枸橼酸咖啡因	注射剂：20 mg/ml（相当于10 mg咖啡因base/ml） 口服液：20 mg/ml（相当于10 mg咖啡因base/ml）
26. 纠正水、电解质和酸碱失衡的药物	
26.1 口服	
口服补液盐	见17.5.1节
氯化钾	配溶液用的粉剂
26.2 胃肠外	
葡萄糖	可注射的溶液：5%，10% 等张性，50% 高张性

基本药物

第 15 版 (2007 年 3 月)

世界卫生组织标准清单

葡萄糖与氯化钠	可注射溶液: 4% 葡萄糖, 0.18% 氯化钠 (相当于 Na ⁺ 30 mmol/l, Cl ⁻ 30 mmol/l)
氯化钾	溶液: 11.2% 20-ml 安瓿 (相当于 K ⁺ 1.5 mmol/ml, Cl ⁻ 1.5 mmol/ml)
氯化钠	可注射溶液: 0.9% 等张性 (相当于 Na ⁺ 154 mmol/l, Cl ⁻ 154 mmol/l)
碳酸氢钠	可注射溶液: 1.4% 等张性 (相当于 Na ⁺ 167 mmol/l, HCO ₃ ⁻ 167 mmol/l) 溶液: 8.4% 10-ml 安瓿 (相当于 Na ⁺ 1000 mmol/l, HCO ₃ ⁻ 1000 mmol/l)
□ 乳酸钠, 复合溶液	可注射溶液
26.3 其他	
注射用水	2-ml, 5-ml, 10-ml 安瓿
27. 维生素和矿物质	
抗坏血酸	片剂: 50 mg
□ 骨化醇	胶囊或片剂: 1.25 mg (50 000 IU) 口服液: 250 微克/ml (10 000 IU/ml)
碘	胶囊: 200 mg. 碘化油: 1 ml (480 mg 碘), 0.5 ml (240 mg 碘) 安瓿 (口服或注射); 0.57 ml (308 mg 碘) 药瓶
□ 烟酰胺	片剂: 50 mg
吡多辛	片剂: 25 mg (盐酸盐)
视黄醇	胶囊: 50 000 IU, 100 000 IU, 200 000 IU (作为棕榈酸酯) 口服油性溶液: 100 000 IU (作为棕榈酸酯) /ml 多剂分配 糖衣片: 10 000 IU (作为棕榈酸酯) 水性混悬注射剂: 100 000 IU (作为棕榈酸酯) 2-ml 安瓿
核黄素	片剂: 5 mg
氟化钠	任何适宜的局部配方
硫胺素(B1)	片剂: 50 mg (盐酸盐)
补充清单	
葡萄糖酸钙	注射剂: 100 mg/ml 10-ml 安瓿